

PRINCÍPIO ATIVO	NOMES COMERCIAIS E APRESENTAÇÕES	ADMINISTRAÇÃO	RECONSTITUIÇÃO		DILUIÇÃO		CONCENTRAÇÃO MÁXIMA PARA ADMINISTRAÇÃO	TEMPO DE INFUSÃO	DISPOSITIVO INDICADO
			DILUENTE / VOLUME	ESTABILIDADE	DILUENTE / VOLUME	ESTABILIDADE			
ABCIXIMAB	Reopro 10 mg / 5 ML	Infusão	-	-	7,2 mg em 250 mL ou 9 mg em 250 mL de SF 0,9% ou SG 5%	12 h TR	9 mg em 250 mL de SF 0,9% ou SG 5%	0,125 mcg / kg / min (Máx: 10 mcg/ min)	Bomba + Filtro próprio
		Bolus	-	-	-	-	-	0.25 mg / kg	Seringa
ACETILCISTEÍNA	Fluimucil 10% / 3 mL	Infusão	-	24 h TA	1ª dose (150 mg / Kg): 200 mL SG 5% em 1 h 2ª dose (50 mg / Kg): 500 mL SG 5% em 4 h 3ª dose (100 mg / Kg): SG 5% 1000 mL em 16 h	24 h TA	-	60 min	Macro
ACICLOVIR	Zovirax 250 mg	Infusão	10mL AD	12 h TA	250 mg - 500 mg em 100 mL SF Uma segunda bolsa de infusão deve ser usada para doses entre 500 - 1.000 mg	12 h TA	10 mg / mL	60 min	Macro
ÁCIDO TRANEXÂMICO	Transamin 250 mg / 5 mL	Bolus	-	-	-	Uso imediato	-	Lento (5 min) 1 mL / min	Seringa
		Infusão	-	-	SF 0,9%, SG 5% 25 a 250 mL	-	-	30 min	Macro
ADENOSINA	Adenocard 6mg/2mL	Bolus	-	-	-	-	-	1 - 2 seg	Seringa
ADRENALINA / EPINEFRINA	Efrinalin 1mg/1mL	Bolus	-	-	10 mL SF 0,9%	-	-	3 - 5 min	Seringa
		Infusão	-	-	SG 5% ou SF 0,9 %	24 h TA	16 mcg / mL	ACM	Bomba Foto
ALBUMINA HUMANA	Albumina Humana 20% 50 mL	Infusão	-	-	-	Uso imediato	30 mL / min	1 - 2 mL / min ou ACM	Macro
ALFAEPOIETINA	Eritromax 4.000 UI Eprex 4.000 UI Eprex 10.000 UI Eprex 40.000UI	Bolus	-	-	-	-	-	1 - 5 min	Seringa
ALFENTANILA	Rapifen 2,5 mg / 5 mL	Bolus	-	-	-	-	-	Lento (mín 3 min)	Seringa
		Infusão	-	-	10 mg em 250 mL SF 0,9%, SG 5% ou RL	Uso imediato, TA, protegido da luz	80 mcg / mL	0,5 - 3 mcg / kg / min; taxa média: 1 a 1,5 mcg / kg / min	Macro

PRINCÍPIO ATIVO	NOMES COMERCIAIS E APRESENTAÇÕES	ADMINISTRAÇÃO	RECONSTITUIÇÃO		DILUIÇÃO		CONCENTRAÇÃO MÁXIMA PARA ADMINISTRAÇÃO	TEMPO DE INFUSÃO	DISPOSITIVO INDICADO
			DILUENTE / VOLUME	ESTABILIDADE	DILUENTE / VOLUME	ESTABILIDADE			
ALPROSTADIL	Prostavasin 20 mcg	Infusão	2 mL SF 0,9%	Uso imediato	SF 0,9% 250 mL	Uso imediato	Até 60 mcg em 250 mL SF 0,9%	60 - 120 min (se for adm por via intra-arterial) ou 12 h bomba de infusão	Bomba
ALTEPLASE	Actilyse 10 mg Actilyse 50 mg	Bolus	1 mg / mL DP	24 h TR	-	-	1 mg / mL	1 - 2 min	Seringa
		Infusão	-	-	0,2 mg / mL SF 0,9 %	8 h TA ou 24 h TR	-	30 - 180 min	Bomba
AMICACINA	Amicacina 100mg/2mL Amicacina 500mg/2mL	Infusão	-	-	Até 500 mg em 100 mL de SF 0,9%, SG 5% ou RL (0,25 - 5 mg / mL)	24 h TA	5 mg / mL	30 - 60 min	Macro
AMINOFILINA	Minoton 240 mg / 10 mL	Infusão	-	-	Até 240 mg /250 mL SF 0,9% ou SG 5%	24 h TA	1 mg / mL	> 30 min	Macro
AMIODARONA	Ancoron 150 mg / 3 mL	Bolus lento	-	-	Até 300 mg em 20 mL SG 5% (fibrilação ventricular resistente à ressuscitação)	Uso imediato	-	< 3 min	Seringa
		Infusão	-	-	SG 5% 250 mL (Ecoflac)	24 h TA	2 mg / mL (via periférica) e 6 mg / mL (acesso venoso central)	20 - 120 min	Bomba isento de PVC + Filtro
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO	Doclaxin 1g + 200mg	Bolus	20 mL AD	20 min	-	-	50 mg / mL	3 - 4 min	Seringa
		Infusão	-	-	1,2 g em SF 0,9% 100 mL	4 h TA	10 mg / mL	30 - 40 min	Macro
AMPICILINA SÓDICA	Ampicilina sódica - 1 g	Bolus lento	3mL DP ou 10mL AD	1 h TA	-	-	-	125 mg - 500 mg : 3 - 5 min; 1 - 2 g: 10 - 15 min	Seringa
		Infusão intermitente	3mL DP ou 10mL AD	-	500 mg - 1 g : 50 mL SF 0,9%; 2 g 100 mL SF 0,9%	8 h TA e 24 h TR (concentração de 30 mg / mL) ou 48 h (concentrações até 20 mg / mL)	30 mg / mL	até 1,5 g - 15 a 30 min	Macro
ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL	Ambisome 50 mg	Infusão (exclusivo)	12 mL AD (agitar por 30 seg) - terá aspecto amarelo translúcido	Uso imediato	SG 5% - volume necessário para gerar conc mín de 0,2 mg / mL - 2 mg / mL	Uso imediato	4 mg / mL	1 - 2 h	Bomba + Filtro próprio

