

PRINCÍPIO ATIVO	NOME COMERCIAL E APRESENTAÇÃO	FORMA FARMACÉUTICA	ADMINISTRAÇÃO POR VIA ENTERAL?	MÉTODO	MODO DE PREPARO	INTERAÇÃO FÁRMACO-NUTRIENTE	RISCO OCUPACIONAL	OBSERVAÇÃO/SUGESTÃO	FORMA FARMACÉUTICA ALTERNATIVA
ACETAZOLAMIDA	Diamox 250mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(4, 8, 11, 13)</sup>	Triturar e diluir <sup>(4, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(4, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
ACETILCISTEÍNA	Fluimucil D 600mg	GRANULADO	Sim <sup>(5, 8, 10, 11)</sup>	Diluir <sup>(1, 10, 11)</sup>	Diluir em 50-100mL de água potável. <sup>(1, 10, 11)</sup>	Não <sup>(1)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Se usar o xarope, diluir em 15mL de água antes do uso.	Acetilcisteína 20mg/mL xarope Fluimucil (acetilcisteína) 100mg/mL injetável
ACETILCISTEÍNA	Fluimucil 600mg	COMPRIMIDO EFERVESCENTE	Sim <sup>(5, 8, 10, 11)</sup>	Diluir <sup>(1, 10, 11)</sup>	Diluir em 50-100mL de água potável. <sup>(1, 10, 11)</sup>	Não <sup>(1)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Se usar o xarope, diluir em 15mL de água antes do uso.	Acetilcisteína 20mg/mL xarope Fluimucil (acetilcisteína) 100mg/mL injetável
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO	AAS 100mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(8)</sup>	Diluir <sup>(4, 5)</sup>	Dissolver em 10 mL de água potável. <sup>(4, 5, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Administrar com comida para evitar irritação gástrica. <sup>(9)</sup>	-
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO	Somalgin Cardio 81mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não foram encontrados dados em literatura sobre administração deste medicamento via sonda.	AAS 100mg comprimido
ÁCIDO FÓLICO	Endofolin 5mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(5, 8, 11, 13)</sup>	Triturar e diluir <sup>(5, 11)</sup>	Triturar e diluir em 15mL de água. <sup>(5, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
ÁCIDO TRANEXÂMICO	Transamin 250mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(8, 10)</sup>	Triturar e diluir <sup>(8, 10)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 20ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(10)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	A opção injetável pode ser mais apropriada.	Transamin (ácido tranexâmico) 50mg/mL injetável
ALENDRONATO DE SÓDIO	Alendronato de Sódio 70mg	COMPRIMIDO	Não <sup>(8, 9)</sup>	-	-	Sim <sup>(1, 9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Alto risco de obstrução da sonda. <sup>(8)</sup>	-
ALOPURINOL	Zyloric 100mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(8, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(10, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
ALPRAZOLAM	Frontal 0,5mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(8, 10, 11, 13)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
AMANTADINA	Mantidan 100mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
AMILORIDA + HIDROCLOROTIAZIDA	Amilorida 5mg + Hidroclorotiazida 50mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(8, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(10, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
AMIODARONA	Atlansil 200mg	COMPRIMIDO	Não <sup>(8, 10)</sup>	-	Utilizar a opção gotas.	Sim <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Administrar consistentemente em relação às refeições, não perde ação mas sofre influência do alimento. Para minimizar desconforto intestinal administrar com refeição. <sup>(9)</sup>	Ancoron (Amiodarona) 200mg/mL gotas
AMITRIPTILINA	Amytril 25mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir em 15mL de água potável. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Pode ser administrado com comida para evitar o desconforto gastrointestinal. <sup>(9)</sup>	-
AMOXICILINA + CLAVULANATO	Clavulin BD 875mg + 125mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(8, 10)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 20ml de água mineral. <sup>(11)</sup> Diluição lenta. <sup>(10)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Sempre dar preferência para a apresentação suspensão que deve ser diluída em 15ml de água mineral. <sup>(11)</sup>	Clavulin BD (amoxicilina + clavulanato) 400mg/5mL suspensão Doclaxin (amoxicilina + clavulanato) 1,2g injetável
ANLÓDIPINO	Norvasc 5mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(5, 8, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(5, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(5, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
APIXABANA	Eliquis 2,5mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(9)</sup>	Triturar e diluir <sup>(9)</sup>	Triturar e diluir em 60mL de água potável. Administrar imediatamente. <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
ASPARTATO DE ORNITINA	Hepa-Merz 0,6g/g	GRANULADO	Não <sup>(11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Falta de estudos que comprovem a segurança e eficácia. <sup>(11)</sup> Necessidade de diluição em grande volume de líquido, 1 copo. <sup>(11)</sup>	Hepa-Merz (aspartato de ornitina) 500mg/mL injetável

PRINCÍPIO ATIVO	NOME COMERCIAL E APRESENTAÇÃO	FORMA FARMACÉUTICA	ADMINISTRAÇÃO POR VIA ENTERAL?	MÉTODO	MODO DE PREPARO	INTERAÇÃO FÁRMACO-NUTRIENTE	RISCO OCUPACIONAL	OBSERVAÇÃO/SUGESTÃO	FORMA FARMACÉUTICA ALTERNATIVA
ATENOLOL	Atenolol 25mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(11, 13)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Administrar imediatamente após preparo. <sup>(11)</sup> Princípio ativo pouco solúvel em água. <sup>(8, 13)</sup>	-
ATORVASTATINA	Lipitor 10mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(4, 8, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(4, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. Fotossensível. <sup>(4, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
AXETILCEFUROXIMA	Zinnat 250mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(4, 10)</sup>	Diluir <sup>(4, 10)</sup>	Diluir o medicamento em 15mL de água mineral. <sup>(4)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Para administração via sonda pode ser mais adequado o uso do comprimido, já que a suspensão é muito viscosa. <sup>(4)</sup> Se usar a suspensão, diluir cada 10mL em 20mL de água. <sup>(10)</sup>	Zinacef (cefuroxima) 750mg injetável  Zinnat (axetilcefuroxima) 250mg/5mL suspensão oral
AZATIOPRINA	Imuran 50mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Não <sup>(8, 11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Sim <sup>(8, 9, 11)</sup>	Risco ocupacional ao manipulador. <sup>(8, 11)</sup>	Avaliar outro imunossupressor.
AZITROMICINA	Zitromax 500mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(8, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Dar preferência para a opção suspensão que deve ser diluída em água mineral.	Azitromicina 600mg suspensão oral Zitromax (azitromicina) 500mg injetável
BACILLUS CLAUSI	Enterogermina 5mL	SUSPENSÃO	Sim	-	Aspirar com o dosador. Realizar a lavagem da sonda.	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
BAMIFILINA	Bamiflix 300mg	DRÁGUA	Sim <sup>(10, 11, 13)</sup>	Triturar e diluir <sup>(10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(10, 11)</sup>	Não <sup>(1)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
BETAÍSTINA	Labirin 8mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(4, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(4, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(4, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
BIPERIDENO	Akineton 2mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(8)</sup>	Triturar e diluir <sup>(13)</sup>	O medicamento deve ser triturado, diluído e administrado imediatamente em 15 mL de água potável. <sup>(10)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
BISACODIL	Dulcolax 5mg	COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO RETARDADA	Não <sup>(5, 8, 10, 11, 13)</sup>	-	-	Sim, com derivados do leite. <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	A perda do revestimento entérico pela trituração pode propiciar a inativação do princípio ativo. <sup>(5, 8, 13)</sup> O medicamento possui revestimento que quando triturado pode obstruir o acesso enteral. <sup>(11)</sup> Utilizar a opção gotas.	Guttalax (dulcolax) 7,5mg/mL gotas
BISOPROLOL	Concor 1,25mg Concor 5mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Não <sup>(1, 11, 13)</sup>	-	O medicamento não deve ser triturado devido à falta de estudos que comprovem a segurança e eficácia. <sup>(1, 11, 13)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	O médico responsável deve avaliar risco x benefício. <sup>(11)</sup>	-
BROMAZEPAM	Lexotan 3mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(8, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
BUCLIZINA	Buclina 25mg	COMPRIMIDO	Não	-	-	Administrar 30 minutos antes da refeição para efeito terapêutico. <sup>(1, 9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não foram encontradas informações sobre o uso deste medicamento por via sonda enteral.	Apevitin (cipreptadina) xarope Diluir a dose em igual volume de água mineral.
BUDESONIDA	Entocort 3mg	CÁPSULA COM MICROGRÂNULOS	Não <sup>(8)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	A perda do revestimento entérico pela trituração propicia a inativação do princípio ativo e não permite a absorção do medicamento (liberação controlada ileal), além do risco de obstrução da sonda. <sup>(8)</sup>	-
BUPROPIONA	Bupropiona 150mg	COMPRIMIDO DE AÇÃO PROLONGADA	Não <sup>(8, 10, 11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	A perda do revestimento durante a trituração prejudica a liberação controlada levando ao risco de toxicidade, alteração na farmacocinética e risco de obstrução do acesso entera	Bupropiona 30mg/mL solução oral
BUSPIRONA	Ansitec 5mg	COMPRIMIDO	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não foram encontrados dados em literatura sobre administração deste medicamento via sonda.	-
CAFÉINA	Cafeína 200mg	CÁPSULA	Sim <sup>(14)</sup>	Diluir <sup>(14)</sup>	Abri a cápsula e diluir em 15 mL de água potável. <sup>(14)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-

PRINCÍPIO ATIVO	NOME COMERCIAL E APRESENTAÇÃO	FORMA FARMACÉUTICA	ADMINISTRAÇÃO POR VIA ENTERAL?	MÉTODO	MODO DE PREPARO	INTERAÇÃO FÁRMACO-NUTRIENTE	RISCO OCUPACIONAL	OBSERVAÇÃO/SUGESTÃO	FORMA FARMACÉUTICA ALTERNATIVA
CALCITRIOL	Rocaltrol 0,25mcg	CÁPSULA	Não <sup>(10)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não é recomendado, pois a dose extraída pode ser incompleta e o conteúdo pode aderir à parede da sonda, causando obstrução. <sup>(8, 10)</sup>	Depura (colecálciferol) 500UI/gota
CANDESARTANA	Atacand 8mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(13)</sup>	Triturar e diluir <sup>(4)</sup>	Administração imediata após preparo para evitar hidrólise da pró-droga. <sup>(13)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Administração imediata após preparo para evitar hidrólise da pró-droga. <sup>(13)</sup>	-
CAPTOPRIL	Captopril 25mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(8, 10, 11, 13)</sup>	Triturar e diluir <sup>(10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 20ml de água mineral. <sup>(10, 11)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Interage com alimento, companhar efeito terapêutico e risco benefício de pausa na dieta.	Outro inibidor da ECA: Enalapril 5mg comprimido
CARBAMAZEPINA	Tegretol 200mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(4, 8, 10, 11)</sup>	Diluir <sup>(4, 11)</sup>	Diluir o medicamento em 20ml de água mineral e aguardar sua completa dissolução. <sup>(4, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	Sempre dar preferência para apresentação suspensão que também deve ser diluída em 20ml de água mineral. <sup>(8, 10, 11)</sup>	Tegretol (carbamazepina) 20mg/mL suspensão oral
CARBONATO DE CÁLCIO	Oscal 500mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Não <sup>(11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	O medicamento possui revestimento que quando triturado pode obstruir o acesso enteral. <sup>(8, 11)</sup>	Carbonato de cálcio sachê
CARBONATO DE CÁLCIO	Carbonaco de Cálcio 1g	PÓ PARA DISSOLUÇÃO	Sim <sup>(14)</sup>	Diluir <sup>(14)</sup>	Para completa dissolução cada 1g deve diluído em 40mL de água potável. <sup>(14)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL	Oscal D 500mg + 400UI	COMPRIMIDO REVESTIDO	Não <sup>(8, 11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	O medicamento possui revestimento que quando triturado pode obstruir o acesso enteral. <sup>(8, 11)</sup>	Carbonato de cálcio sachê
CARBONATO DE LÍCIO	Carbolitium 300mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(8, 10, 13)</sup>	Triturar e diluir <sup>(10)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 20ml de água mineral. <sup>(10)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Monitorar níveis plasmáticos de Lítio. <sup>(9, 13)</sup> Administrar com alimento para minizar desconforto gástrico. <sup>(9)</sup>	-
CARVEDILOL	Carvedilol 3,125mg Carvedilol 12,5mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(5, 8, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(5, 11)</sup>	Triturar e diluir em 15mL de água. <sup>(5, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	A administração com alimento minimiza o risco de hipotensão ortostática. <sup>(9)</sup>	-
CEFADROXILA	Cefadroxila 500mg	CÁPSULA	Sim <sup>(10, 11)</sup>	Diluir <sup>(10, 11)</sup>	Abrir a cápsula. Diluir o medicamento em 20ml de água mineral. <sup>(11)</sup> Observação: sempre dar preferência para a apresentação suspensão que deve ser diluída em 15ml de água mineral.	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Sempre dar preferência para a apresentação suspensão que deve ser diluída em 15ml de água mineral.	Cefadroxila 250mg/5mL suspensão oral
CETOPROFENO	Profenid 50mg	CÁPSULA	Sim <sup>(8, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(8, 10)</sup>	Diluir o conteúdo da cápsula em 20mL de água mineral. Administrar imediatamente após dissolução do medicamento. <sup>(8, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	Bicerto (cetoprofeno) 1mg/mL injetável
CETOROLACO DE TROMETAMOL	Toragesic 10mg	COMPRIMIDO SUBLINGUAL	Não <sup>(8, 11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Comprimido para administração sublingual. Não há indicação de uso por outras vias. <sup>(11)</sup> Verificar com fonoaudiologia e EMTN a possibilidade de administração sub-lingual sem aumentar o risco de broncoaspiração.	Toragesic (cetorolaco de trometamol) 30mg/mL injetável
CICLOBENZAPRINA	Miosan 5mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(8, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(10, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
CICLOSPORINA	Sandimmun Neoral 25mg Sandimmun Neoral 50mg Sandimmun Neoral 100mg	CÁPSULA	Não <sup>(4, 8, 10, 11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	Não adequado para administração por via sonda enteral além de oferecer risco ocupacional ao manipular. <sup>(4, 8, 10, 11)</sup>	Sandimmun Neoral (ciclosporina) 100mg/mL solução oral Sandimmun (ciclosporina) 50mg/mL injetável
CILOSTAZOL	Cebralat 50mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(8, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. <sup>(11)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Recomenda-se administração administração 30 minutos antes ou 2 horas depois da refeição. <sup>(9)</sup> Avaliar risco-benefício da pausa da dieta enteral.	-
CIPROFIBRATO	Lipless 100mg	COMPRIMIDO	Não	-	-	Não <sup>(1, 9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não foram encontrados dados em literatura sobre administração deste medicamento via sonda.	-
CIPROFLOXACINO	Cipro 500mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(8, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar o medicamento e diluir em 20ml de água mineral. <sup>(11)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Evitar uso concomitante de de antiácidos, alimentos derivados do leite e produtos que contenham cálcio. <sup>(9)</sup> A administração de ciprofloxacina e dieta enteral pode acarretar a diminuição da absorção do fármaco. <sup>(8, 9)</sup> Avaliar a necessidade de pausa na dieta.	Hifloxac (ciprofloxacino) 400mg/200mL injetável

PRINCÍPIO ATIVO	NOME COMERCIAL E APRESENTAÇÃO	FORMA FARMACÉUTICA	ADMINISTRAÇÃO POR VIA ENTERAL?	MÉTODO	MODO DE PREPARO	INTERAÇÃO FÁRMACO-NUTRIENTE	RISCO OCUPACIONAL	OBSERVAÇÃO/SUGESTÃO	FORMA FARMACÉUTICA ALTERNATIVA
CIPROTERONA	Androcur 50mg	COMPRIMIDO	Não <sup>(9)</sup>	-	RISCO OCUPACIONAL. <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	Risco de carcinogenicidade, teratogenicidade, toxicidade reprodutiva, genotoxicidade e tem um perfil estrutural ou de toxicidade semelhante aos agentes perigosos existentes. <sup>(9)</sup>	-
CITALOPRAM	Cipramil 20mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(4, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
CLARITROMICINA	Klaricid UD 500mg	COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	A perda do revestimento durante a trituração prejudica a liberação controlada do medicamento. <sup>(11)</sup> Considerar o uso da suspensão que deve ser diluída em igual volume de água potável, porém ainda com risco de obstrução de sonda 9Fr ou de menor calibre. <sup>(4)</sup>	Klaricid (claritromicina) 50mg/mL suspensão oral Klaricid (claritromicina) 500mg injetável
CLINDAMICINA	Clindamicina 300mg	CÁPSULA	Sim <sup>(4, 8, 11, 12)</sup>	Diluir <sup>(4, 8, 11)</sup>	A cápsula pode ser aberta e o conteúdo diluído em água. <sup>(8)</sup> Diluir o conteúdo da cápsula em 15ml de água mineral.	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Pode ocorrer irritação e danos ao TGI. <sup>(8)</sup> Usar a dieta como proteção ao trato gastrointestinal. <sup>(13)</sup>	Clindamicina 600mg/4mL injetável
CLOBAZAM	Frisium 10mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(4, 8, 11, 13)</sup>	Triturar e diluir <sup>(4, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(4, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
CLOMIPRAMINA	Anafranil 25mg	DRÁGEA	Não <sup>(8)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Possui revestimento e excipientes que podem causar obstrução da sonda. <sup>(8)</sup> Pode ser administrado com comida para evitar o desconforto gastrointestinal. <sup>(9)</sup>	-
CLONAZEPAM	Rivotril 0,25mg Rivotril 0,5mg Rivotril 2mg	COMPRIMIDO SUBLINGUAL	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	Não é adequado para administração por sonda enteral. Sempre dar preferência para apresentação gotas que deve ser diluída em 10ml de água mineral. <sup>(8, 11)</sup>	Rivotril (clonazepam) 2,5mg/mL gotas
CLONIDINA	Atensina 0,1mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(8, 11, 13)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Os comprimidos desintegram-se após aproximadamente 2 minutos em 10mL de água para formar uma dispersão fina que pode ser administrada por uma sonda de 8Fr sem obstrução. <sup>(4)</sup>	Clonidin (clonidina) 150mcg/mL injetável
CLOPIDROGREL	Clopidogrel 75mg Plavix 75mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(4, 5, 8, 11, 13)</sup>	Triturar e diluir <sup>(4, 5, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(4, 5, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Administrar imediatamente, pois o princípio ativo sofre hidrólise. <sup>(13)</sup>	-
CLORETO DE POTÁSSIO	Slow K 600mg	COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Possui liberação modificada. Não triturar. Não adequado para administração por sonda enteral. <sup>(4)</sup> Não deve ser triturado, pois perde a característica de liberação gradativa além de possuir revestimento que quando macerado causa a obstrução da sonda. <sup>(8, 11)</sup> Utilizar a suspensão oral que deve ser diluída em 15 mL de água mineral.	lonclor (cloreto de potássio) 60mg/mL suspensão oral
CLORETO DE POTÁSSIO	Cloreto de Potássio 600mg	CÁPSULA	Não <sup>(14)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Contém excipientes de liberação lenta que podem comprometer a dissolução. Não é recomendada a diluição para administração via sonda. <sup>(14)</sup> Utilizar a suspensão oral que deve ser diluída em 15 mL de água mineral.	lonclor (cloreto de potássio) 60mg/mL suspensão oral
CLORPROMAZINA	Amplitil 100mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir em 15mL de água potável. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Pode ser administrado com comida para evitar o desconforto gastrointestinal. <sup>(9)</sup>	Amplitil (clorpromazina) 40mg/mL gotas
CLORTALIDONA	Clortalidona 12,5mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(4, 8, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(4, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(4, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
CLOZAPINA	Leponex 25mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(15)</sup>	Triturar e diluir <sup>(15)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(15)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Comprimido simples. A bula respalda o uso do comprimido partido. <sup>(1)</sup>	-
COLCHICINA	Colchis 0,5mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(10, 11)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Usar luvas e máscara para preparo. <sup>(9)</sup>	-
COLESTIRAMINA	Questran Light 4g	PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	Sim <sup>(11)</sup>	Diluir <sup>(11)</sup>	Diluir o medicamento em 100ml de água mineral e aguardar 2 minutos para sua completa dissolução. Administrar imediatamente e com intervalo entre os demais medicamentos devido o risco de interferência na absorção. <sup>(4, 9, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-

PRINCÍPIO ATIVO	NOME COMERCIAL E APRESENTAÇÃO	FORMA FARMACÉUTICA	ADMINISTRAÇÃO POR VIA ENTERAL?	MÉTODO	MODO DE PREPARO	INTERAÇÃO FÁRMACO-NUTRIENTE	RISCO OCUPACIONAL	OBSERVAÇÃO/SUGESTÃO	FORMA FARMACÉUTICA ALTERNATIVA
COMPLEXO B	Beneroc	DRÁGEA	Não <sup>(4, 5, 8, 11)</sup>	-	-	Não <sup>(1)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Medicamento possui revestimento e excipientes que podem obstruir a sonda quando macerados. <sup>(4, 5, 8, 11)</sup>	Hplex B (complexo B) injetável Complexo B solução oral
CUMARINA + TROXERRUTINA	Venalot 15mg + 90mg	COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Há risco de obstrução da sonda <sup>(10)</sup> , além de perder as características de liberação prolongada. <sup>(1)</sup>	-
DABIGATRANA	Pradaxa 75mg Pradaxa 110mg	CÁPSULA	Não <sup>(11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	O medicamento não deve ser triturado ou diluído devido ser encapsulado com ácido tartárico. Deve ser administrado intacto. <sup>(11)</sup> A abertura da cápsula aumenta em 75% a absorção e pode causar efeitos adversos sérios. <sup>(9)</sup>	Outros anticoagulantes: Xarelto (rivaroxabana) Eliquis (apixabana) Marevan (varfarina)
DAPAGLIFLOZINA	Forxiga 10mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não foram encontrados dados em literatura sobre administração deste medicamento via sonda.	Amaryl (glimperidina) 1mg comprimido
DEFLAZACORTE	Calcort 30mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(4, 8, 9, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(6)</sup>	Triturar e diluir em 10mL de água. <sup>(4)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
DESCLOFENIRAMINA	Polaramine 2mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 20ml de água mineral. Administrar imediatamente. Observação: válido apenas para apresentação 2mg, a apresentação 6mg não deve ser triturada. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Dar preferência para o uso de Polaramine gotas. <sup>(11)</sup>	Polaramine gotas diluir em 10mL de água potável
DESVENLAFAXINA	Pristiq 50mg	COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	Não <sup>(11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	A perda do revestimento durante a trituração prejudica a liberação controlada do medicamento. <sup>(11)</sup>	-
DEXAMETASONA	Decadron 4mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(5, 8, 10, 11, 13)</sup>	Triturar e diluir <sup>(5, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 20ml de água mineral. <sup>(5, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Sempre dar preferência para a apresentação elixir que deve ser diluída em 15 mL de água mineral. <sup>(8, 11)</sup> A dieta ameniza os efeitos irritantes no trato gastrointestinal. <sup>(9, 13)</sup>	Decadron (dexametasona) 0,1mg/mL elixir
DIAZEPAM	Valium 5mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(5, 8, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(5, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. <sup>(5, 10, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	Compaz (diazepam) 5mg/mL injetável
DIGOXINA	Digoxina 0,25mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(8, 11, 13)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. <sup>(11)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Manter níveis adequados de potássio na dieta, pois a hipocalemia diminui a ação da digoxina. <sup>(9)</sup> Recomenda-se monitoramento eletrocardiográfico. <sup>(13)</sup> Uma refeição rica em fibras pode diminuir a absorção. <sup>(1)</sup>	Digoxina 0,05 mg/mL elixir
DILTIAZEM	Cardizem 60mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(8, 9, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(9, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
DIMENDRINATO + PIRIDOXINA	Dramin B6	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(8, 11, 13)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11, 13)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Sempre dar preferência para a apresentação solução que deve ser diluída em 10ml de água mineral a cada 1ml do medicamento. <sup>(11)</sup>	Dramin B6 solução oral gotas
DIOSMINA + HESPERIDINA	Daflon 450mg + 50mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 20ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	A bula também respalda a dissolução do comprimido. <sup>(1)</sup>	-
DIPIRONA	Novalgina 500mg Dipirona 500mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(5, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(5, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. <sup>(5, 10, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Sempre dar preferência para a apresentação gotas que deve ser diluída a cada 20 gotas em 20ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(11)</sup>	Dipirona 500mg/mL gotas Novalgina (dipirona) 500mg/mL gotas
DIVALPROATO DE SÓDIO	Depakote Sprinkle 125mg	CÁPSULA	Não <sup>(9)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	Sempre dar preferência para a apresentação xarope que deve ser diluída em 20mL de água mineral. <sup>(8, 11)</sup>	Depakene (valproato de sódio) 250mg/5mL xarope
DIVALPROATO DE SÓDIO	Depakote 250mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Não <sup>(8, 11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	A perda do revestimento durante a trituração pode favorecer irritação da mucosa gástrica. Sempre dar preferência para a apresentação xarope que deve ser diluída em 20mL de água mineral. <sup>(8, 11)</sup>	Depakene (valproato de sódio) 250mg/5mL xarope
DOMPERIDONA	Motilium 10mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(4, 8, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(4, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. <sup>(4, 10, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Sempre dar preferência para a apresentação suspensão que deve ser diluída a cada 10ml em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(11)</sup>	Motilium (domperidona) 1mg/mL suspensão oral
DONEPEZILA	Eranz 5mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(8, 10, 11, 13)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-

PRINCÍPIO ATIVO	NOME COMERCIAL E APRESENTAÇÃO	FORMA FARMACÉUTICA	ADMINISTRAÇÃO POR VIA ENTERAL?	MÉTODO	MODO DE PREPARO	INTERAÇÃO FÁRMACO-NUTRIENTE	RISCO OCUPACIONAL	OBSERVAÇÃO/SUGESTÃO	FORMA FARMACÉUTICA ALTERNATIVA
DOXAZOSINA	Unoprost 2mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(6)</sup>	Triturar e diluir <sup>(6)</sup>	Tritura e diluir em 10 mL de água. <sup>(6)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
DOXICICLINA	Vibramicina 100mg	COMPRIMIDO SOLÚVEL	Sim <sup>(1, 10)</sup>	Diluir <sup>(1, 10)</sup>	Dissolver em 50 mL de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(1, 10)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
DULOXETINA	Cymbalta 30mg	CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	Não <sup>(4, 8, 10, 11, 13)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Alto risco de obstrução da sonda. <sup>(4, 8)</sup> A perda do revestimento durante a trituração prejudica a liberação controlada do medicamento. <sup>(11, 13)</sup>	Duloxetine 30mg/mL solução oral manipulada
DUTASTERIDA	Avodart 0,5mg	CÁPSULA	Não <sup>(1)</sup>	-	-	Não <sup>(1, 9)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	As cápsulas devem ser engolidas inteiras e não podem ser mastigadas nem abertas, pois o contato com seu conteúdo provoca irritação da mucosa orofaríngea. <sup>(1)</sup>	Outro agente antiprostático: Unoprost (doxazosina) 2mg comprimido
EMPAGLIFLOZINA	Jardiance 10mg Jardiance 25mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não foram encontrados dados em literatura sobre administração deste medicamento via sonda.	Januvia (sitagliptina) 50mg comprimido
ENALAPRIL	Renitec 5mg Renitec 20mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(5, 8, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(5, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(5, 10, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
ENTACAPONA	Comtan 200mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(8, 10, 11, 13)</sup>	Triturar e diluir <sup>(10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. <sup>(10, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
ESCITALOPRAM	Lexapro 10mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(8, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Sempre dar preferência para apresentação solução que deve ser diluída em 10ml de água mineral. <sup>(11)</sup>	Lexapro (escitalopram) 20mg/mL gotas
ESCOPOLAMINA	Buscopan Simples 10mg	DRÁGUA	Sim <sup>(5, 8, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(5)</sup>	Triturar e diluir em 20mL de água (revestimento mascara odor e sabor). <sup>(5, 11)</sup>	Não <sup>(1)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Sempre dar preferência para a apresentação solução que deve ser diluída em 15ml de água mineral. <sup>(11)</sup>	Buscopan Simples (escopolamina) 10mg/mL gotas Buscopan Simples (escopolamina) 20mg/mL injetável
ESCOPOLAMINA + DIPIRONA	Buscopan Composto	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 20ml de água mineral. <sup>(10, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Dar preferência para a apresentação solução oral que deve ser diluída em 15 mL de água mineral. <sup>(10, 11)</sup>	Buscopan Composto gotas
ESOMEPRAZOL	Nexium 20mg	COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO RETARDADA	Sim <sup>(4, 8, 10, 11)</sup>	Diluir <sup>(4, 8, 10, 11)</sup>	Não triturar. O comprimido deve ser disperso em água e a solução obtida deve ser administrada via sonda. <sup>(4, 10, 11)</sup>	Não <sup>(1)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
ESPIRONOLACTONA	Aldactone 25mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(5, 8)</sup>	Triturar e diluir <sup>(5)</sup>	Triturar e diluir em 15mL de água potável. <sup>(5, 11)</sup>	Sim <sup>(1, 9)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	O alimento aumenta a biodisponibilidade, administrar de forma consistente com ou sem alimento para minimizar flutuações na exposição ao fármaco. <sup>(1, 9)</sup> Acompanhar níveis séricos de potássio. <sup>(9)</sup>	-
EZETIMIBA	Zetia 10mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(4, 10)</sup>	Triturar e diluir <sup>(4, 10)</sup>	Triturar e diluir em 15mL de água mineral. <sup>(4, 10)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
FAMOTIDINA	Famox 20mg	COMPRIMIDO	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não foram encontrados dados em literatura sobre administração deste medicamento via sonda.	Nexium (esomeprazol) 20mg comprimido
FENAZOPIRIDINA	Pyridium 100mg Pyridium 200mg	DRÁGUA	Sim <sup>(8, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 20ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(10, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
FENITOÍNA	Hidantal 100mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(5, 8, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(5, 11)</sup>	Triturar e diluir em 10mL de água. Administrar imediatamente. <sup>(5, 11)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	A interação com a nutrição enteral pode diminuir a absorção do fármaco em até 80%. <sup>(5, 8, 11)</sup> Avaliar a necessidade de monitorar nível sérico, sinais e sintomas clínico e/ou necessidade de pausa na dieta. Alterações na dieta também devem ser acompanhadas de perto em relação ao efeito terapêutico/tóxico, medicamento de janela terapêutica estreita.	Fental (fenitoína) 50mg/mL injetável
FENOBARBITAL	Gardenal 100mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(5, 8, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(5, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. <sup>(5, 10, 11)</sup>	Não <sup>(1, 9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Sempre dar preferência para a apresentação solução. A cada 20 gotas diluir em 20ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(8, 10, 11)</sup>	Gardenal (fenobarbital) pediátrico 40mg/mL gotas
FENOFIBRATO	Fenofibrato 200mg	CÁPSULA	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não foram encontrados dados em literatura sobre administração deste medicamento via sonda.	-

PRINCÍPIO ATIVO	NOME COMERCIAL E APRESENTAÇÃO	FORMA FARMACÉUTICA	ADMINISTRAÇÃO POR VIA ENTERAL?	MÉTODO	MODO DE PREPARO	INTERAÇÃO FÁRMACO-NUTRIENTE	RISCO OCUPACIONAL	OBSERVAÇÃO/SUGESTÃO	FORMA FARMACÉUTICA ALTERNATIVA
FERROCARBONILA + ASSOCIAÇÕES	Combiron Fólico	COMPRIMIDO REVESTIDO	Não <sup>(11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	O medicamento não deve ser triturado devido à falta de estudos que comprovem a segurança e eficácia. O médico responsável deve avaliar risco x benefício. <sup>(11)</sup>	Existe Combiron suspensão (sem ácido fólico) (não padrão). Pode-se utilizar a suspensão (diluída em 15 mL de água mineral) + ENDOFOLIN 5mg COMPRIMIDO (Acido Fólico) (preparados e administrados separadamente). Para ferro também temos NORIPURUM SOLUCAO ORAL GOTAS - 30mL (FERRIPOLMALTOSE) (sem ácido fólico).
FERROPOLIMALTOSE + ÁCIDO FÓLICO	Noripurum Fólico 100mg + 0,35mg	COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	Não	-	-	-	-	Forma farmacéutica não adequada para administração via sonda enteral.	NORIPURUM SOLUCAO ORAL GOTAS - 30mL (FERRIPOLMALTOSE) (diluir em 15mL de água mineral) + ENDOFOLIN 5mg COMPRIMIDO (Acido Fólico) (diluir em 15 mL de água mineral)
FEFENADINA	Allegra 120mg Allegra 180mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Não <sup>(8,11)</sup>	-	-	Sim. Evite tomar ALLEGRA junto com alimentos ricos em gordura ou com suco de frutas. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não há estudos sobre eficácia, segurança e farmacocinética. <sup>(8)</sup> Possui revestimento que pode obstruir a sonda. <sup>(11)</sup>	Allegra (fexofenadina) 6mg/mL suspensão oral
FEFENADINA + PSEUDOEFEDRINA	Allegra D 60mg + 120mg	COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	Não	-	-	Sim. A administração com alimentos deve ser evitada. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não triturar, pois possui revestimento de liberação prolongada. <sup>(11)</sup>	Allegra D (fexofenadina + pseudoefedrina) suspensão oral
FINASTERIDA	Finasterida 5mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(4, 8, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(4, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. Observação: não deve ser triturado por gestantes. <sup>(4, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	Na presença de gestantes, não é recomendada a trituração de comprimidos de finasterida pelo risco de exposição à substância. <sup>(8, 11)</sup>	-
FLUCONAZOL	Zoltec 100mg	CÁPSULA	Sim <sup>(4, 8, 10, 11)</sup>	Diluir <sup>(4, 8, 10, 11)</sup>	Diluir o conteúdo da cápsula em 20ml de água mineral. Administrar imediatamente após dissolução do medicamento. <sup>(4, 8, 10, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	-	Zoltec (fluconazol) 2mg/mL injetável
FLUDROCORTISONA	Florinefe 0,1mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(4, 8, 9, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(4, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(4, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	A presença de alimento diminui o desconforto gastrointestinal. <sup>(9)</sup>	-
FLUNARIZINA	Flunarin 10mg	CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	Não <sup>(8)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Medicamento possui excipientes que podem obstruir a sonda quando macerados e solubilizados. <sup>(8)</sup>	Vertex solução oral
FLUOXETINA	Prozac 20mg	CÁPSULA	Sim <sup>(5, 8, 10, 11)</sup>	Diluir <sup>(5, 10, 11)</sup>	Abrir a cápsula e diluir o conteúdo em 20mL de água mineral. Administrar imediatamente após dissolução do medicamento. <sup>(5, 10, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Dar preferência para a solução.	Daforin (fluoxetina) 20mg/mL gotas
FUROSEMIDA	Lasix 40mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(5, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(5, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(5, 10, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	Lasix (furosemida) 10mg/mL injetável
GABAPENTINA	Gabapentina 300mg Gabapentina 400mg Neurontin 300mg	CÁPSULA	Sim <sup>(4, 8, 10, 11)</sup>	Diluir <sup>(4, 8, 10)</sup>	Abrir a cápsula, diluir em 10mL de água e administrar imediatamente. <sup>(4, 8, 10)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
GALANTAMINA	Reminyl ER 8mg	CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Cápsula de liberação modificada. Não é adequada para administração via sonda enteral. <sup>(4)</sup> Não deve ser triturado, pois perde as características de liberação controlada levando ao risco de toxicidade, manutenção inadequada do nível sérico do fármaco, além do risco de obstrução da sonda. <sup>(8)</sup>	-
GLICAZIDA	Diamicron MR 30mg	COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	Não <sup>(4, 8, 11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não deve ser triturado, pois perde as características de liberação modificada levando ao risco de toxicidade e manutenção inadequada do nível sérico do fármaco. <sup>(4, 8)</sup> A perda do revestimento durante a trituração prejudica a liberação controlada levando ao risco de toxicidade, alteração na farmacocinética e risco de obstrução do acesso enteral. <sup>(11)</sup>	Amaryl (glimiperida) 1mg comprimido
HALOPERIDOL	Haldol 5mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(8, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar o medicamento e diluir em 10ml de água mineral. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Dar preferência para apresentação solução. Diluir a cada 10ml do medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(11)</sup>	Haldol (haloperidol) 2mg/mL gotas
HIDRALAZINA	Apresolina 25mg	DRÁGEA	Sim <sup>(4, 5, 8, 10)</sup>	Triturar e diluir <sup>(5, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir em 15mL de água potável. <sup>(5, 10, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Monitorar a pressão arterial, pois a trituração pode acarretar degradação do princípio ativo e consequente redução da efetividade do fármaco. <sup>(8)</sup> Administrar todos os dias no mesmo horário, sempre da mesma forma, com ou sem alimentos. <sup>(11)</sup> O revestimento contém açúcar. <sup>(4)</sup>	Nepresol 20mg/mL injetável

PRINCÍPIO ATIVO	NOME COMERCIAL E APRESENTAÇÃO	FORMA FARMACÉUTICA	ADMINISTRAÇÃO POR VIA ENTERAL?	MÉTODO	MODO DE PREPARO	INTERAÇÃO FÁRMACO-NUTRIENTE	RISCO OCUPACIONAL	OBSERVAÇÃO/SUGESTÃO	FORMA FARMACÉUTICA ALTERNATIVA
HIDROCLOROTIAZIDA	Clorana 25mg	COMPRI­MIDO	Sim <sup>(5, 8, 11, 13)</sup>	Triturar e diluir <sup>(5, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(5, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
HIDROXICLOROQUINA	Requinol 400mg	COMPRI­MIDO REVESTIDO	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não foram encontrados dados em literatura sobre administração deste medicamento via sonda.	-
HIDROXIUREIA	Tepev 500mg	CÁPSULA	Não <sup>(5, 10)</sup>	-	-	Não <sup>(1)</sup>	Sim <sup>(1, 9)</sup>	Risco ocupacional ao manipulador. <sup>(5, 10)</sup>	Hidroxiureia solução oral manipulada
HIDROXIZINA	Hixine 25mg	COMPRI­MIDO REVESTIDO	Sim <sup>(8, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Sempre dar preferência para a apresentação suspensão que deve ser diluída a cada 5ml em 10ml água mineral. <sup>(11)</sup>	Hixizine (hidroxizina) 2mg/mL
IMIPRAMINA	Imipra 25mg	COMPRI­MIDO REVESTIDO	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não foram encontrados dados em literatura sobre administração deste medicamento via sonda. O Tofranil pode ser triturado e diluído em 15ml de água potável segundo literatura. <sup>(8, 10)</sup>	-
INDAPAMIDA	Natrilix 2,5mg	COMPRI­MIDO REVESTIDO	Sim <sup>(4)</sup>	Triturar e diluir <sup>(4)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(4)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
INDAPAMIDA	Natrilix SR 1,5mg	COMPRI­MIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	Não <sup>(4)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Comprimido de liberação modificada. Não adequado para administrado via sonda enteral. Usar o comprimido simples. <sup>(4)</sup>	Natrilix (indapamida) 2,5mg comprimido
ISOSSORBIDA	Isordil 5mg	COMPRI­MIDO SUBLINGUAL	Não <sup>(8, 9, 11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Comprimido para administração sublingual. Não há indicação de uso por outras vias. <sup>(8, 9, 11)</sup>	Monocordil (isossorbida) 20mg comprimido
ISOSSORBIDA	Monocordil 20mg	COMPRI­MIDO	Sim <sup>(8, 10)</sup>	Triturar e diluir <sup>(10)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. <sup>(10)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
IVABRADINA	Procoralan 5mg	COMPRI­MIDO REVESTIDO	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	Não foram encontrados dados em literatura sobre administração deste medicamento via sonda.	-
IVERMECTINA	Revectina 6mg	COMPRI­MIDO	Sim <sup>(10)</sup>	Triturar e diluir <sup>(10)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(10)</sup>	Não <sup>(1, 9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
LACOSAMIDA	Vimpat 50mg	COMPRI­MIDO REVESTIDO	Não <sup>(9)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Utilizar a opção solução (não padrão). <sup>(4, 9)</sup>	Vimpat (lacosamida) 10mg/mL solução oral
<i>Lactobacillus acidophilus</i>	Prolive	CÁPSULA	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	Enterogermina (bacillus clausii) flaconete
LAMOTRIGINA	Lamitor CD 25mg Lamitor CD 100mg	COMPRI­MIDO PARA SUSPENSÃO	Sim <sup>(1, 9)</sup>	Diluir <sup>(1, 9)</sup>	Dispersar em 10mL de água. <sup>(1, 9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
LEVETIRACETAM	Keppra 250mg	COMPRI­MIDO REVESTIDO	Sim <sup>(4)</sup>	Triturar e diluir <sup>(4)</sup>	Triturar e diluir em 10mL de água. <sup>(4)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Dar preferência para a opção solução oral que deve ser diluída em 10 mL de água potável.	Keppra (levetiracetam) 100mg/mL solução oral
LEVODOPA + BENSERAZIDA	Prolopa 100mg + 25mg	COMPRI­MIDO PARA SUSPENSÃO	Sim <sup>(8, 9, 10, 11)</sup>	Diluir <sup>(1, 9)</sup>	Diluir o comprimido em 25 mL de água potável. <sup>(1, 9, 10)</sup>	Sim <sup>(8, 9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	A administração de Prolopa e dieta enteral pode acarretar na diminuição da absorção do fármaco. <sup>(8, 9, 11)</sup> Avaliar o risco-benefício de ajuste de dose ou pausa na dieta. Atenção também para variações na dieta (jejum e retorno da alimentação). Acompanhar o efeito terapêutico.	-
LEVODOPA + BENSERAZIDA	Prolopa BD 100mg + 25mg	COMPRI­MIDO	Sim <sup>(10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(10, 11)</sup>	Sim <sup>(8, 9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	A administração de Prolopa e dieta enteral pode acarretar na diminuição da absorção do fármaco. <sup>(8, 9, 11)</sup> Avaliar o risco-benefício de ajuste de dose ou pausa na dieta. Atenção também para variações na dieta (jejum e retorno da alimentação). Acompanhar o efeito terapêutico.	Prolopa (levodopa + benserazida) 100mg + 25mg comprimido dispersível
LEVODOPA + BENSERAZIDA	Prolopa HBS 125mg	CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	Não <sup>(9, 10)</sup>	-	-	Sim <sup>(8, 9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	O produto possui liberação modificada, portanto não deve ser aberto para administração via sonda enteral.	Prolopa (levodopa + benserazida) 100mg + 25mg comprimido dispersível

PRINCÍPIO ATIVO	NOME COMERCIAL E APRESENTAÇÃO	FORMA FARMACÉUTICA	ADMINISTRAÇÃO POR VIA ENTERAL?	MÉTODO	MODO DE PREPARO	INTERAÇÃO FÁRMACO-NUTRIENTE	RISCO OCUPACIONAL	OBSERVAÇÃO/SUGESTÃO	FORMA FARMACÉUTICA ALTERNATIVA
LEVOFLOXACINO	Levaquin 500mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(8, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(10, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	Levofloxacino 5mg/mL injetável
LINAGLIPTINA	Trayenta 5mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Não <sup>(11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	O medicamento não deve ser triturado devido à falta de estudos que comprovem a segurança e eficácia. <sup>(11)</sup>	Amaryl (glimepirida) 1mg comprimido
LOPERAMIDA	Imosec 2mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(8, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 20ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
LORATADINA	Claritin 10mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(8, 10, 11, 13)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 20ml de água mineral. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Sempre dar preferência para a apresentação solução ou suspensão que devem ser diluídas em 15ml de água mineral. <sup>(11)</sup>	Claritin (loratadina) 1mg/mL xarope mineral. <sup>(11)</sup>
LORAZEPAM	Lorax 1mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(8, 11)</sup>	Diluir <sup>(11)</sup>	Diluir o medicamento em 15ml de água mineral sem triturar. Administrar imediatamente. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
LOSARTANA	Cozaar 50mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(4, 5, 8, 10, 11, 13)</sup>	Triturar e diluir <sup>(4, 5, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(4, 5, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
MACROGOL	Muvinalx 14g	PÓ PARA PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA	Sim <sup>(11)</sup>	Diluir <sup>(11)</sup>	Diluir em 125ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(1)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	Lactulona (lactulose) 667mg/mL xarope (diluir em água potável)
MAGNÉSIO + PIRIDOXINA	Magnen B6	COMPRIMIDO REVESTIDO	Não <sup>(11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	O medicamento não deve ser triturado devido à falta de estudos que comprovem a segurança e eficácia.	Pidomag (pidolato de magnésio) flaconete
MEBEVERINA	Duspatalin 200mg	CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	Não <sup>(11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	O medicamento não deve ser triturado devido à falta de estudos que comprovem a segurança e eficácia. <sup>(11)</sup>	-
MECLOZINA	Meclin 25mg	COMPRIMIDO	Não <sup>(11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	O medicamento não deve ser triturado devido à falta de estudos que comprovem a segurança e eficácia. <sup>(11)</sup>	-
MEMANTINA	Alois 10mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Não <sup>(13)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	O fabricante não recomenda triturar e/ou diluir. <sup>(1, 14)</sup> O comprimido apresenta revestimento entérico. <sup>(15)</sup>	Alois (memantina) 10mg/mL gotas
MESALAZINA	Pentasa 500mg	COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Quando triturado o medicamento sofre alteração e consequente perda da eficácia. <sup>(8)</sup>	-
METADONA	Mytedom 5mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(5, 8, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(5, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(5, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	Mytedom (metadona) 10mg/mL injetável
METFORMINA	Glifage 500mg Metformina 500mg Metformina 850mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(4, 8, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(4, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 20ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(11)</sup> Risco de obstrução em sonda de fino calibre. <sup>(8)</sup> Administrar em sonda de no mínimo 8Fr. <sup>(6)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Administrar com dieta para minimizar irritação gastrointestinal. <sup>(9)</sup>	-
METFORMINA	Glifage XR 500mg	COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	Não <sup>(4, 8, 10, 11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Comprimido de liberação modificada, não adequado para trituração e administração por sonda. A perda do revestimento durante a trituração prejudica a liberação controlada do medicamento. Usar opção de liberação imediata. <sup>(4, 8, 10, 11)</sup>	Glifage (metformina) 500mg
METILDOPA	Aldomet 250mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(4, 8, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(4, 11)</sup>	Triturar e diluir em 20mL de água potável. <sup>(4, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Administrar com comida para evitar irritação gástrica. <sup>(9)</sup> Os comprimidos podem ser triturados, porém o revestimento pode não dissolver por completo e obstruir a sonda. A lavagem da sonda evita possíveis obstruções. <sup>(4)</sup>	-
METOPROLOL (SUCCINATO)	Selozok 25mg	COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	Não <sup>(5, 8, 10, 11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	Não triturar: perde as características de liberação, levando ao risco de manutenção inadequada do nível sérico do fármaco. Pode aumentar o risco de bradicardia. <sup>(5, 8, 10, 11)</sup>	Seloken (tartarato de metoprolol) 100mg comprimido
METOPROLOL (TARTARATO)	Seloken 100mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(8, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(10, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	-	-

PRINCÍPIO ATIVO	NOME COMERCIAL E APRESENTAÇÃO	FORMA FARMACÉUTICA	ADMINISTRAÇÃO POR VIA ENTERAL?	MÉTODO	MODO DE PREPARO	INTERAÇÃO FÁRMACO-NUTRIENTE	RISCO OCUPACIONAL	OBSERVAÇÃO/SUGESTÃO	FORMA FARMACÉUTICA ALTERNATIVA
METRONIDAZOL	Flagyl 250mg Flagyl 400mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(8, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 20ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	O Flagyl comprimido é levemente solúvel em água. <sup>(4)</sup> A presença de alimento diminui o desconforto gastrointestinal. <sup>(9)</sup>	Metronidazol 40mg/mL solução oral (manipulado) Metronidazol 5mg/mL Injetável
MICOFENOLATO DE MOFETILA	Cellcept 500mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Não <sup>(8, 10)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Sim <sup>(1, 9)</sup>	Como CellCept® mostrou ter efeito teratogênico seus comprimidos não devem ser triturados para evitar inalação ou contato direto com a pele ou mucosa. <sup>(1)</sup>	As opções de suspensão e injetável são importadas. Existe possibilidade de adaptação da forma farmacéutica para xarope simples.
MIDAZOLAM	Dormonid 7,5mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(8, 11, 13)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Dar preferência para o uso da solução oral.	Dormire (midazolam) 2mg/mL solução oral (A cada 10 gotas diluir em 10ml de água mineral <sup>(11)</sup> )
MIRTAZAPINA	Remeron Soltab 15mg	COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não deve ser triturado, pois perde as características de liberação levando ao risco de manutenção inadequada do nível sérico do fármaco. <sup>(8)</sup> A perda do revestimento durante a trituração prejudica a liberação controlada do medicamento. <sup>(11)</sup> Verificar com a fonoaudiologia a possibilidade de usar de forma orodispersível sem causar risco de broncoaspiração.	-
MODAFILINA	Stavigile 100mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(9)</sup>	Triturar e diluir <sup>(4)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(4)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
MONTELUCASTE DE SÓDIO	Singulair 5mg	COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Forma farmacéutica não adequada para administração por sonda enteral. Usar a opção granulada (sache).	Montelair (montelucaste de sódio) 4mg envelope
MONTELUCASTE DE SÓDIO	Montelair 4mg	GRANULADO	Sim <sup>(11)</sup>	Diluir <sup>(11)</sup>	Diluir o conteúdo do sachê em 15 mL de água potável. Administrar após dissolução. <sup>(10)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
MORFINA	Dimorf 10mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(8, 11, 13)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	A presença da dieta diminui a irritação do trato gastrointestinal. <sup>(9)</sup>	Dimorf ( morfina) 1mg/mL injetável - 2mL Dimorf ( morfina) 10mg/mL solução oral
NARATRIPTANA	Naramig 2,5mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(10)</sup>	Triturar e diluir <sup>(10)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 20ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(10)</sup> Os comprimidos dissolvem rapidamente em água. <sup>(4)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
NIFEDIPINO	Nifedipress Retard 20mg	COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO RETARDADA	Não <sup>(4)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Comprimido de liberação modificada. Não adequado para administrado via sonda enteral. Usar o comprimido simples. <sup>(4)</sup>	-
NILOTINIBE	Tasigna 200mg	CÁPSULA	Não	-	-	Sim <sup>(9)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	-	Nilotinibe 20mg/mL suspensão
NIMODIPINO	Nimodipino 30mg	CÁPSULA	Não <sup>(14)</sup>	-	-	Não <sup>(14)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Tem liberação modificada e contém excipientes não solúveis. Não recomendada a dissolução. <sup>(14)</sup>	Nimodipino solução (manipulado)
NITAZOXANIDA	Annita 500mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir em 15mL de água potável. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	Annita (notozoxanida) 20mg/mL suspensão oral
NITROFURANTOÍNA	Macrodantina 100mg	CÁPSULA	Sim <sup>(4, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(4, 11)</sup>	Abrir a cápsula, tritura e diluir o conteúdo da cápsula em 20ml de água mineral. Administrar imediatamente após completa dissolução do medicamento. <sup>(4, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	Nitrofurantoína 5mg/mL solução oral (manipulado)
NORTRIPTILINA	Pamelor 10mg	CÁPSULA	Sim <sup>(8, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(8, 11)</sup>	As cápsulas podem ser abertas e o conteúdo dissolvido em 15 mL água potável imediatamente antes da administração. <sup>(8, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
OLANZAPINA	Zyprexa 2,5mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Não <sup>(10, 11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	O medicamento possui revestimento que quando triturado pode obstruir o acesso enteral. <sup>(10, 11)</sup> Usar a opção orodispersível diluída em 20 mL de água mineral. <sup>(1, 4)</sup>	Zyprexa Zydys (olanzapina) 5mg comprimido
OLANZAPINA	Zyprexa Zydys 5mg	COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL	Sim <sup>(1, 4)</sup>	Diluir <sup>(1, 4)</sup>	Diluir o comprimido em 20mL de água mineral. <sup>(1, 4)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-

PRINCÍPIO ATIVO	NOME COMERCIAL E APRESENTAÇÃO	FORMA FARMACÉUTICA	ADMINISTRAÇÃO POR VIA ENTERAL?	MÉTODO	MODO DE PREPARO	INTERAÇÃO FÁRMACO-NUTRIENTE	RISCO OCUPACIONAL	OBSERVAÇÃO/SUGESTÃO	FORMA FARMACÉUTICA ALTERNATIVA
OLMESARTANA	Benicar 20mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Não <sup>(8, 11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	O medicamento não deve ser triturado devido à falta de estudos que comprovem a segurança e eficácia. <sup>(8, 11)</sup>	Cozaar (losartana) 50mg comprimido
ONDANSETRONA	Vonau Flash 4mg	COMPRIMIDO DE DESINTEGRAÇÃO ORAL	Não <sup>(5, 11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Comprimido orodispersível. Não há indicação de uso por outras vias. Uma opção é usar o comprimido simples. <sup>(5, 11)</sup> Importante avaliar a possibilidade de administração orodispersível para cada paciente.	Nausebron (ondansetrona) 8mg comprimido Ansetron (ondansetrona) 4mg/2mL injetável
OXCARBAZEPINA	Trileptal 300mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(4, 8, 10)</sup>	Triturar e diluir <sup>(4, 10)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(4, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	Utilizar a suspensão. Cada 10mL deve ser diluído em 30mL de água potável. <sup>(4, 10)</sup>	Trileptal (oxcarbazepina) 6% suspensão oral
OXIBUTININA	Retemic 5mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(9)</sup>	-	Não foram encontrados dados em literatura dados sobre o modo de preparo para administração via sonda.	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
OXICODONA	Oxycontin 10mg	COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	Não <sup>(8, 11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não deve ser triturado, pois perde as características de liberação controlada levando ao risco de toxicidade e manutenção inadequada do nível sérico do fármaco, o que pode levar à depressão respiratória. <sup>(8, 11)</sup>	Outro opióide que possa ser administrado via sonda ou outro opióide injetável.
PANTOPRAZOL	Pantozol 20mg	COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO RETARDADA	Não <sup>(8, 10, 11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	A perda do revestimento entérico pela trituração pode propiciar a inativação do princípio ativo. <sup>(8)</sup> Possui revestimento que quando triturado pode obstruir o acesso enteral. <sup>(10, 11)</sup>	Nexium (esomeprazol) 20mg comprimido
PARECETAMOL + CAFEÍNA	Tylenol 750mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(8, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Sempre dar preferência para apresentação gotas que deve ser diluída em 20ml de água mineral. <sup>(11)</sup>	Tylenol (paracetamol) 200mg/mL gotas
PARECETAMOL + CAFEÍNA	Tylenol DC 500mg + 65mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(8, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	Tylenol (paracetamol) 200mg/mL gotas + Cafeína 200mg capsula
PARECETAMOL + CODEÍNA	Tylex 7,5mg + 500mg Tylex 30mg + 500mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(8, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(10, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
PAROXETINA	Aropax 20mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Não <sup>(8, 11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	Não triturar, pois possui excipientes que podem obstruir a sonda. <sup>(8)</sup>	Outro inibidor seletivo da recaptação de serotonina: Daforin (fluoxetina) 20mg/mL gotas Zoloft (sertralina) 50mg comprimido
PASSIFLORA + ASSOCIAÇÕES	Pasalix 100mg + 30mg + 100mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não foram encontrados dados em literatura sobre administração deste medicamento via sonda.	Sintocalmy (passiflora) gotas (diluir em 10mL de água potável)
PIOGLITAZONA	Stanglit 15mg	COMPRIMIDO	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não foram encontrados dados em literatura sobre administração deste medicamento via sonda.	Amaryl (glicemiprida) 1mg comprimido
PIRIDOSTIGMINA	Mestinon 60mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(8, 10)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 20ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(8, 10)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
PLANTAGO OVATA	Metamucil 5,85g	PÓ PARA PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA	Não <sup>(10)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Risco de obstrução da sonda. <sup>(10)</sup>	Muvinlax 14g envelope (diluir em 125 mL de água potável) Lactulona (lactulose) 667mg/mL xarope (diluir em água potável)
POLISTIRENOSSULFONATO DE CÁLCIO	Calnate 30g	PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL E/OU RETAL	Não <sup>(4, 10, 11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Alto risco de obstrução do acesso enteral. Utilizar a via retal. <sup>(4, 10, 11)</sup>	-
PRAMIPEXOL	Sifrol 0,125mg Sifrol 0,25mg Sifrol 1mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(8, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(10, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
PRAVASTATINA	Pravastatina 20mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(10)</sup>	Triturar e diluir <sup>(10)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(10)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-

PRINCÍPIO ATIVO	NOME COMERCIAL E APRESENTAÇÃO	FORMA FARMACÉUTICA	ADMINISTRAÇÃO POR VIA ENTERAL?	MÉTODO	MODO DE PREPARO	INTERAÇÃO FÁRMACO-NUTRIENTE	RISCO OCUPACIONAL	OBSERVAÇÃO/SUGESTÃO	FORMA FARMACÉUTICA ALTERNATIVA
PREDNISOLONA	Prelone 20mg	COMPRIMIDO	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não foram encontrados dados em literatura sobre administração deste medicamento via sonda.	Predsim (prednisolona) 3mg/mL solução oral (diluir em 15ml de água potável)
PREDNISONA	Meticorten 5mg Meticorten 20mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(5, 8, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(5, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(5, 10, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	Predsim (prednisolona) 3mg/mL solução oral (diluir em 15ml de água potável)
PREGABALINA	Lyrica 75mg	CÁPSULA	Sim <sup>(4, 11)</sup>	Diluir <sup>(4, 11)</sup>	Abri a cápsula e diluir o conteúdo em 20ml de água mineral. Administrar imediatamente após dissolução do medicamento. <sup>(4, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
PRIMIDONA	Primid 100mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(10)</sup>	Triturar e diluir <sup>(10)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(10)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
PROMETAZINA	Fenergan 25mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(5, 8, 10, 11, 13)</sup>	Triturar e diluir <sup>(5, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(5, 8, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	Fenergan (prometazina) 25mg/mL injetável
PROPAFENONA	Ritmonorm 300mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(8, 10, 10)</sup>	Triturar e diluir <sup>(10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(10, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Há a opção de solução manipulada.	Ritmonorm (propafenona) 150mg/mL solução (manipulado)
PROPATILNITRATO	Sustrate 10mg	COMPRIMIDO SUBLINGUAL	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Comprimido para administração sublingual. Não há indicação de uso por outras vias. <sup>(5, 8, 11)</sup> Caso engolido não fará a ação no tempo adequado. <sup>(5)</sup> Avaliar a possibilidade de uso da via sublingual sem aumento do risco de broncoaspiração para o paciente.	-
PROPRANOLOL	Propranolol 40mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(5, 8, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(5, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(5, 10, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	O lexicomp recomenda a administração com estômago vazio. <sup>(9)</sup> Avaliar risco-benefício de ajuste de dose ou pausa na dieta. Atenção também para variações na dieta (jejum e retorno da alimentação). Acompanhar o efeito terapêutico.	-
PRUCALOPRIDA	Resolor 1mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Não <sup>(11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	O medicamento não deve ser triturado devido à falta de estudos que comprovem a segurança e eficácia. <sup>(11)</sup>	Guttalax (picossulfato de sódio) 7,5mg/mL gotas Lactulona (lactulose) 667mg/mL xarope
QUETIAPINA	Seroquel 25mg Seroquel 100mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(5, 8, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(5, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(5, 10, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
RACECADOTRILA	Tiorfan 100mg	CÁPSULA	Sim <sup>(8, 10)</sup>	Diluir <sup>(8, 10)</sup>	As cápsulas podem ser abertas e o conteúdo dissolvido em 15 mL de água potável imediatamente antes da administração. <sup>(8)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
RACECADOTRILA	Tiorfan 30mg	PÓ GRANULADO	Sim <sup>(11)</sup>	Diluir <sup>(11)</sup>	Diluir o conteúdo do sachê em 50mL de água e aguardar a completa dissolução. Administrar imediatamente. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
RAMELTEONA	Rozerem 8mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não foram encontrados dados em literatura sobre administração deste medicamento via sonda.	-
RAMIPRIL	Naprix 5mg	COMPRIMIDO	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não foram encontrados dados em literatura sobre administração deste medicamento via sonda.	Outro inibidor da ECA: Renitec (enalapril) 5mg comprimido Renitec (enalapril) 20mg comprimido
RIFAMPICINA	Rifaldin 300mg	CÁPSULA	Não	-	-	Sim <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não há estudos sobre eficácia, segurança e farmacocinética. <sup>(9)</sup> Verificar possibilidade de pausa na dieta.	FURP-Rifampicina suspensão oral 20 mg/mL (diluir em 15 mL de água mineral)
RIFAXIMINA	Xifaxan 550mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sem dados	-	-	Sim <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não foram encontrados dados em literatura sobre administração deste medicamento via sonda. Avaliar risco-benefício.	-
RISPERIDONA	Risperdal 1mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(4, 5, 8, 10, 10)</sup>	Triturar e diluir <sup>(4, 5, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(4, 5, 10, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Dar preferência para a solução oral. <sup>(8, 11)</sup>	Risperdal (risperidona) 1mg/mL solução oral
RIVAROXAABANA	Xarelto 10mg Xarelto 15mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(1, 11)</sup>	Triturar e diluir. <sup>(1, 10)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(1, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Doses acima de 15 mg devem ser administradas com alimento. Doses menores podem ser administradas com ou sem alimento. <sup>(9)</sup>	-

PRINCÍPIO ATIVO	NOME COMERCIAL E APRESENTAÇÃO	FORMA FARMACÉUTICA	ADMINISTRAÇÃO POR VIA ENTERAL?	MÉTODO	MODO DE PREPARO	INTERAÇÃO FÁRMACO-NUTRIENTE	RISCO OCUPACIONAL	OBSERVAÇÃO/SUGESTÃO	FORMA FARMACÉUTICA ALTERNATIVA
RIVASTIGMINA	Exelon 1,5mg Exelon 6mg	CÁPSULA	Não <sup>(8, 11, 13)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não há estudos sobre eficácia, segurança e farmacocinética. <sup>(8, 11)</sup> As cápsulas não podem ser abertas e contêm excipientes que podem obstruir a sonda. <sup>(13)</sup>	Exelon (rivastigmina) Patch 5 (4,6mg/24h) Exelon (rivastigmina) Patch 15 (13,3mg/24h) Exelon (rivastigmina) Patch 10 (9,5mg/24h) Exelon (rivastigmina) solução oral 2mg/mL
ROSUVASTATINA	Crestor 10mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(4, 10, 11, 13)</sup>	Triturar e diluir <sup>(4, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(4, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
SACUBITRIL + VALSARTANA	Entresto 50mg Entresto 100mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não foram encontrados dados em literatura sobre administração deste medicamento via sonda.	Cozaar (losartana) 50mg comprimido Renitec (enalapril) 5mg comprimido
SENNÁ ALEXANDRINA + CASSIA	Naturetti 28,9mg + 19,5mg	CÁPSULA	Não <sup>(10, 11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Alto risco de obstrução da sonda enteral. <sup>(10, 11)</sup>	Lactulona (lactulose) 667mg/mL xarope (diluir em água potável)
SERTRALINA	Zoloft 50mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(4, 8, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(4, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(4, 10, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Acompanhar o uso contínuo que pode aumentar o risco de obstrução do acesso enteral. <sup>(8, 11)</sup>	-
SIMETICONA	Simeticona 40mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(8, 10)</sup>	Triturar e diluir <sup>(10)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 20ml de água mineral. <sup>(10)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Sempre dar preferência para a apresentação solução. A cada 20 gotas, diluir em 20ml de água mineral.	Simeticona 75mg/mL gotas
SINVASTATINA	Sinvastatina 10mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(4, 5, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(5, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(5, 10, 11)</sup> A dissolução completa pode levar alguns minutos. <sup>(4, 8)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
SITAGLIPTINA	Januvia 50mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(10, 11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 20ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(10, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
SOTALOL	Sotalol 120mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(8, 10)</sup>	Triturar e diluir <sup>(8, 10)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(10)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA	Bactrim F 800mg + 160mg	COMPRIMIDO	Não <sup>(5, 8, 11)</sup>	-	Utilizar a opção suspensão.	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	O princípio ativo e os excipientes quando triturados podem causar obstrução da sonda. <sup>(5, 8, 11)</sup>	Bactrim F (sulfametoxazol + trimetoprima) 400mg + 80mg suspensão oral Bactrim (sulfametoxazol + trimetoprima) 200mg + 40mg suspensão oral
SULFATO FERROSO	Sulferrol	COMPRIMIDO	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	Noripurum (ferropolimaltose) gotas
TACROLIMO	Prograf 1mg	CÁPSULA	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	As cápsulas é pequena o que dificulta a sua abertura. O conteúdo da cápsula é facilmente dissolvido em água. Porém, o tacrolimo é incompatível com PVC, portanto os materiais usados na manipulação não podem conter PVC. <sup>(4)</sup> Além disso, ele possui risco ocupacional ao manipulador. <sup>(9)</sup> Existe fórmula manipulada líquida validada.	Tacrolimo solução (manipulado)
TAMOXIFENO	Nolvadex-D 20mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Não <sup>(10)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	Risco ocupacional para o manipulador. <sup>(10)</sup>	-
TANSULOSINA	Tansulosina 0,4mg	COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	Não <sup>(8, 11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	A trituração e solubilização do princípio ativo não são recomendadas. <sup>(8)</sup> Deve ser administrado intacto, caso contrário, não há eficácia comprovada. <sup>(11)</sup> Além de perder a cinética de liberação prolongada.	Tansulosina 0,4mg/mL (manipulado)
TIAMAZOL	Tapazol 10mg	COMPRIMIDO	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	O medicamento não deve ser triturado devido à falta de estudos que comprovem a segurança e eficácia. <sup>(8, 11)</sup>	-

PRINCÍPIO ATIVO	NOME COMERCIAL E APRESENTAÇÃO	FORMA FARMACÉUTICA	ADMINISTRAÇÃO POR VIA ENTERAL?	MÉTODO	MODO DE PREPARO	INTERAÇÃO FÁRMACO-NUTRIENTE	RISCO OCUPACIONAL	OBSERVAÇÃO/SUGESTÃO	FORMA FARMACÉUTICA ALTERNATIVA
TIAMINA	Benerva 300mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(4, 5, 8, 11, 13)</sup>	Triturar e diluir <sup>(5, 11)</sup>	Triturar e diluir em 15mL de água. <sup>(5, 11)</sup> Os comprimidos desintegram-se em água em aproximadamente 2 minutos com leve agitação para formar uma dispersão fina que pode ser administrada por uma sonda de 8Fr sem obstrução. <sup>(4)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
TIAMINA + CIANOCOBALAMINA + PIRIDOXINA	Citoneurin 5.000mcg	DRÁGEA	Não <sup>(11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Medicamento possui revestimento e excipientes que podem obstruir a sonda quando macerados. Risco de obstrução de sonda. <sup>(8, 10)</sup>	Citoneurin (tiamina + cianocobalamina) 5.000mcg injetável
TICAGRELOR	Brilinta 90mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(1, 9)</sup>	Triturar e diluir <sup>(1, 9)</sup>	Triturar até a obtenção de um pó fino e misturar em 20mL de água. Usar mais 20 mL se necessário para diluir algum resíduo restante. Aspirar com a seringa azul e administrar. Usar sonda 8Fr ou maior. <sup>(1, 9)</sup>	Não <sup>(1, 9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
TIOCOLCHICOSÍDEO	Coltrax 4mg	COMPRIMIDO	Não <sup>(1, 11)</sup>	-	O medicamento não deve ser triturado devido à falta de estudos que comprovem a segurança e eficácia. <sup>(1, 11)</sup>	Não encontrado nas literaturas consultadas <sup>(1, 9)</sup>	Não encontrado nas literaturas consultadas. <sup>(1, 9)</sup>	O médico responsável deve avaliar risco x benefício. <sup>(11)</sup>	Coltrax (tiocolchicosídeo) 2mg/mL injetável
TOPIRAMATO	Topamax 100mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(4, 8, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(4, 10, 11)</sup>	Diluir o medicamento em 10mL de água mineral e aguardar 5 minutos para sua completa dissolução. <sup>(4, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	-	-
TRAMADOL	Tramal 50mg	CÁPSULA	Sim <sup>(4, 10)</sup>	Triturar e diluir <sup>(10)</sup>	Abrir a cápsula e diluir em 15mL de água. <sup>(10)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Sempre dar preferência para apresentação gotas que deve ser diluída em 20mL de água mineral. <sup>(10)</sup>	Tramal (tramadol) 100mg/mL gotas Tramal (tramadol) 50mg/mL injetável
TRAZODONA	Donaren 50mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(8, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água mineral. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
TRETINOÍNA	Vesanoid 10mg	CÁPSULA	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	Risco ocupacional ao manuseador. <sup>(1, 9)</sup> Administrar com alimento. <sup>(9)</sup>	Tretinoína 40mg/5mL (dispersão em óleo fixo)
TRIMETAZIDINA	Vastarel MR 35mg	COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	O medicamento não deve ser triturado devido à falta de estudos que comprovem a segurança e eficácia. <sup>(8, 11)</sup> Além de perder as características de liberação prolongada. <sup>(11)</sup>	-
TRIXIFENIDIL	Artane 2mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(9)</sup>	Diluir <sup>(9)</sup>	Os comprimidos desintegram-se rapidamente em água para formar uma dispersão fina que pode ser administrada por uma sonda de 8Fr sem obstrução. <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Os comprimidos desintegram-se rapidamente em água para formar uma dispersão fina que pode ser administrada por uma sonda de 8Fr sem obstrução. <sup>(9)</sup>	-
VALACICLOVIR	Valtrex 500mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(4, 10, 11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(4, 10)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10mL de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(4, 10, 11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	Uni Vir (aciclovir) 250mg injetável
VALPROATO DE SÓDIO	Depakene 250mg	CÁPSULA	Não	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	Sempre dar preferência para a apresentação xarope que deve ser diluída em 20mL de água mineral. <sup>(8, 11)</sup>	Depakene (valproato de sódio) 250mg/5mL xarope
VALSARTANA	Diovan 80mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(8, 11, 13)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15mL de água mineral. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
VANCOMICINA	Vancomicina 125mg	CÁPSULA	Sim <sup>(14)</sup>	Diluir <sup>(14)</sup>	Abrir a cápsula e retirar todo o conteúdo e diluir em água 15mL de água potável. <sup>(14)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
VARFARINA	Marevan 2,5mg	COMPRIMIDO	Sim <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 10mL de água mineral. Administrar imediatamente. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	A prática clínica mostra que caso a faixa alvo de INR não esteja sendo alcançada, a administração em jejum pode ser uma alternativa. Porém, a pausa na infusão de uma dieta enteral pode acarretar deficiência de nutrientes necessários. Além disso, o aumento da velocidade de infusão de todo o volume de dieta necessário pode causar efeitos adversos como por exemplo diarreia. O anticoagulante rivaroxabana pode ser uma opção neste caso, pois já tem a administração por sonda prevista em bula.	Xareto (rivaroxabana) 10mg comprimido Xareto (rivaroxabana) 15mg comprimido

PRINCÍPIO ATIVO	NOME COMERCIAL E APRESENTAÇÃO	FORMA FARMACÉUTICA	ADMINISTRAÇÃO POR VIA ENTERAL?	MÉTODO	MODO DE PREPARO	INTERAÇÃO FÁRMACO-NUTRIENTE	RISCO OCUPACIONAL	OBSERVAÇÃO/SUGESTÃO	FORMA FARMACÉUTICA ALTERNATIVA
VENLAFAXINA	Efexor XR 37,5mg	CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	Não <sup>(8, 10, 11, 13)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não deve ser triturado, pois perde as características de liberação controlada levando ao risco de toxicidade, manutenção inadequada do nível sérico do fármaco, além do risco de obstrução da sonda. <sup>(8)</sup> A forma farmacéutica não é adequada para administração via sonda enteral. Alterar para velafaxina comprimido simples (Aché/Biossintética) com 2 tomadas ao dia se necessário. <sup>(4, 10)</sup>	Venlafaxina comprimido simples (Aché/Biossintética) ou Velafaxina solução (manipulado)
VERAPAMIL	Dilacoron 80mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(8, 11, 13)</sup>	Triturar e diluir <sup>(11)</sup>	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. <sup>(11)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	-	-
VIGABATRINA	Sabril 500mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(8)</sup>	Triturar e diluir	Triturar e diluir o medicamento em 15ml de água mineral. Administrar imediatamente.	Não <sup>(9)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	-	-
VITAMINA E	Ephynal 400mg	CÁPSULA GELATINOSA	Não <sup>(8, 10, 11)</sup>	-	-	Não <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	Não se recomenda, pois a dose extraída pode ser incompleta e o conteúdo pode aderir à parede da sonda causando obstrução. <sup>(8, 10, 11)</sup>	-
VORICONAZOL	Vfend 200mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(4, 8, 10)</sup>	Triturar e diluir <sup>(4, 10)</sup>	Triturar e diluir m 20mL de água. Administrar imediatamente. <sup>(4, 10)</sup>	Sim <sup>(1, 9)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	Há necessidade de pausar a dieta 1 hora antes e 1 hora depois da administração do medicamento, pois interage com alimento e deve ser tomado de estômago vazio. <sup>(1, 9, 10)</sup> Verificar com EMTN e infectologia o uso do injetável.	Vfend (voriconazol) 200mg injetável
ZOLPIDEM	Stilnox 10mg	COMPRIMIDO REVESTIDO	Sim <sup>(4, 8, 10)</sup>	Triturar e diluir <sup>(4, 10)</sup>	Triturar e diluir em 15mL de água mineral. <sup>(4, 10)</sup>	Sim <sup>(9)</sup>	Não <sup>(9)</sup>	O alimento pode retardar a ação. <sup>(9)</sup>	-

Referências:

- Bula do medicamento. Consultas: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Disponível em: <<https://consultas.anvisa.gov.br>>
- Manual Para Administração de Medicamentos por Acessos Enterais. Disponível em: <<https://guiafarmaceutico.hsl.org.br/nutricao-enteral-e-parenteral/PublishingImages/medicamentos-via-sonda-enteral/Manual%20medicamentos%20via%20sonda%20enteral.pdf>>
- Guia do Farmacêutico do Hospital Naval Marclio Dias. Disponível em: <<https://www.marinha.mil.br/hnmd/sites/www.marinha.mil.br/hnmd/files/Guia%20Farmacoterap%C3%AAAutico%20HNMD%202020-2021%20revis%C3%A3o%20final%20com%20ficha.pdf>>
- Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes. Disponível em: <<https://rudapt.files.wordpress.com/2017/11/handbook-of-drug-administration-via-enteral-feeding-tubes-2015.pdf>>
- Preparo e administração de medicamento via cateter enteral: um protocolo para farmacêuticos clínicos e equipe multiprofissional. Disponível em: <<https://www.rbhss.org.br/sbrafh/article/view/600/545>>
- Perfil dos medicamentos utilizados via oral e por sonda gastroentérica em um Serviço de Pronto Atendimento. Disponível em: <<https://www.scielo.br/rj/reuap/a/Qk6555LTdRRVhZb9Yhrr4hzP?format=pdf&lang=pt>>
- ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS POR Sonda NASOENTRAL E NASOGÁSTRICA EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. Disponível em: <[https://bdm.unb.br/bitstream/10483/10357/1/2014\\_AnaPaulaVieiraAraujo.pdf](https://bdm.unb.br/bitstream/10483/10357/1/2014_AnaPaulaVieiraAraujo.pdf)>
- Assistência farmacéutica na administração de medicamentos via sonda: escolha da forma farmacéutica adequada. Disponível em: <<file:///K:/PASTAS%20FARMACEUTICOS/Clarissa/Clinica/Sonda.pdf>>
- Lexicomp. Disponível em: <[https://online.lexi.com/co/action/doc/retrieve/docid/pdh\\_f/129174?cesid=4EM2HPPgh25&searchUrl=%2Fco%2Faction%2Fsearch%3Fq%3Dtamoxifeno%26t%3Dname%26va%3Dtamoxifeno%26admp](https://online.lexi.com/co/action/doc/retrieve/docid/pdh_f/129174?cesid=4EM2HPPgh25&searchUrl=%2Fco%2Faction%2Fsearch%3Fq%3Dtamoxifeno%26t%3Dname%26va%3Dtamoxifeno%26admp)>
- RIBEIRO, Paulo Cesar; SILVA, Thaitz Angelica Franconi da; RUOTOLO, Fabiana; BARBOSA, Lívia Maria Gonçalves; POLTRONIERI, Mairi; BORGES, José. Manual para administração de medicamentos por acessos enterais. São Paulo: Editora Atheneu, 2014.
- Ferreir R, Joaquim FM, Pavan AM et al. Manual de diluição e administração de medicamentos por acessos enterais. Braspen Journal. 2019;34 (2):193-212. Disponível em: <<http://arquivos.braspen.org/journal/abr-mai-jun-2019/artigos/14-Manual-de-diluaoc.pdf>>
- <https://www.hospitalosalvador.org.br/wp-content/uploads/2021/01/MANUAL-FARMACEUTICO-2021-22.pdf>
- JAMAL, Yara; DUIMKE, Elber Henrique. Padronização de medicamentos sólidos orais via sonda
- Carta do fabricante.
- IZCO, N.; CREUS, N.; MASSÓ, J.; CODINA, C.; RIBAS, J. Incompatibilidades fármaco-nutrición