


Hipodermóclise

Atuação do farmacêutico

Infusão de fluidos e medicamentos pela via subcutânea



Normalmente indicado para paciente com dificuldade de acesso venoso, como última tentativa de administração de um medicamento em forma farmacêutica injetável

Muito utilizado para pacientes em cuidados paliativos

Avaliar antes se o paciente não pode receber o mesmo medicamento ou terapia por outras vias de administração (ex. enteral/sublingual/ dérmica...)

Antes do uso - se atentar às contra - indicações


Relativas ao paciente

Ex. integridade da pele

Relativas ao medicamento

Ex. indicação, volume, pH.

Sítios de punção e volumes de infusão suportados.



Legenda

- Região abdominal (Até 1000 ml/24h)
- Região torácica (subclavicular) (Até 250 ml/24h)
- Região anterior e lateral da coxa (Até 1500 ml/24h)
- Região escapular (Até 1000 ml/24h)
- Região deltóidea (Até 250 ml/24h)

Durante o Uso - se atentar a:

Possíveis reações adversas

Possíveis incompatibilidades entre medicamentos no mesmo sítio de punção

Efetividade do medicamento

Educação Farmacêutica Corporativa - 2023

Fontes Consultadas

- O uso da via subcutânea em geriatria e cuidados paliativos / organização Daniel Lima Azevedo. – Rio de Janeiro: SBGG, 2016. <https://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2016/06/uso-da-via-subcutanea-geriatria-cuidados-paliativos.pdf>
- <https://guiafarmacologico.hospitalsocamilosp.org.br/> - Acessado em 15/05/2023

